



Disulfiram versterkt het effect van VKA's door remming van het hepatisch metabolisme van VKA's.

Situatie

- 1.
- in gebruik: VKA
 - start: disulfiram



Actie

Melden aan de trombosedienst.
Instrueer de patiënt bij staken van disulfiram contact op te nemen met de trombosedienst.

- 2.
- in gebruik: disulfiram
 - start: VKA



Instrueer de patiënt bij staken van disulfiram contact op te nemen met de trombosedienst.

- 3.
- in gebruik: disulfiram
 - in gebruik: VKA



Instrueer de patiënt bij staken van disulfiram contact op te nemen met de trombosedienst.

- 4.
- staken: disulfiram
 - in gebruik: VKA



5. Actie wanneer de trombosedienst niet bereikbaar is

Disulfiram mag worden afgeleverd.

Zo snel mogelijk of uiterlijk op de eerstvolgende werkdag melden aan de trombosedienst.

6. Overige opmerkingen en aandachtspunten

Het gebruik van disulfiram kan het effect van het VKA veranderen. Enerzijds wordt het metabolisme van het VKA door disulfiram beïnvloed. Anderzijds spelen factoren als staken van alcoholgebruik, mogelijke veranderingen in de leverfunctie (verbeteringen) en toegenomen therapietrouw ten aanzien van VKA-gebruik, een rol. Deze factoren maken het nodig dat de trombosedienst het antistollingsniveau controleert, met name wanneer gestart wordt met disulfiram.